



# Guía de información y manejo ambulatorio para el paciente portador de un drenaje tipo Jackson-Pratt.

## Cuidados del drenaje tipo Jackson-Pratt

¿QUÉ DEBEMOS SABER?

### CONTACTO

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (VIGO)  
Consultas externas de Cirugía General  
-RECEPCIÓN C6-

Telf.: 986811111

El drenaje es importante para usted de cara a asegurar su total recuperación.

Cada organismo se comporta de forma distinta por lo que hay preguntas que no podremos responder:

¿Cuánto tiempo llevará el drenaje?

¿Cuánto líquido producirá?

**NO HAY NORMAS FIJAS**

Confíe en su cirujano. Mantendrá el drenaje el tiempo que sea necesario e indicará el momento de su retirada definitiva o su movilización.

#### • **FUNCIÓN DEL DRENAJE:**

Evacuar líquidos orgánicos para evitar que se acumulen e infecten produciendo abscesos (colecciones de pus) que requieran intervención.

LÍQUIDO SEROSO (amarillo pálido)

LÍQUIDO BILIOSO (verde / amarillo)

LÍQUIDO PANCREÁTICO (grisáceo)

- Eventualmente se realizará un **CONTROL RADIOLÓGICO** (TC o ECO) para apoyar o desestimar la retirada del drenaje.

## SI EL DRENAJE QUE USTED TIENE ES UN JACKSON-PRATT

Estará conectado a una bolsa que recogerá las secreciones por gravedad.

ES IMPORTANTE que la bolsa permanezca SIEMPRE por debajo de la cintura en bipedestación (en una bolsa que pueda sujetar con su mano) y tendida en el suelo cuando se acueste.

Al caminar podrá llevar la bolsa bajo la ropa de forma discreta mediante un sistema de sujeción en el muslo con una liga elástica.



**EL HECHO DE SER PORTADOR DE UN DRENAJE NO DEBE LIMITAR SU MOVILIDAD O SUS ACTIVIDADES DIARIAS.**



### INSTRUCCIONES DE MANEJO

- **MARQUE** con un rotulador INDELEBLE cada mañana a la misma hora el nivel alcanzado colocando la bolsa en vertical. (Ponga la fecha de cada medición)
- **OBSERVE** el aspecto del líquido. Puede cambiar con el tiempo. Coméntelo con su cirujano. En caso de tinte hemático brusco (sangre): Acuda a Urgencias para evaluación.
- **EVITE** tirones y desplazamientos del drenaje. Cualquier movilización inadecuada o sin supervisión podría dar lugar a complicaciones.
- **ACUDA** a la revisión en la fecha indicada por su cirujano.
- **ACLARE** dudas con su cirujano.